

УДК 595.766.16

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хинзориан

Новый вид жесткокрылых — малашек из Армянской ССР

(Coleoptera, Dasytidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 8/VI 1978)

Trichoceble araratlica Iablokoff—Khinzorian sp. nov.

Армянская ССР: Ехегнадзор, у берега Арпы, 20/VII 1950, голотип, самец, хранится в коллекциях института Зоологии АН Армянской ССР.

Голова и переднеспинка черные, верхняя губа, щеки и наличник желтые, надкрылья буровато-желтые, с зачерненной точечностью, низ черный, волосистость светлая, конечности желтые, усики затемнены от 4-го членика. Длина 4,5 мм. Рис. 1, а.




Рис. 1. а—*Trichoceble araratlica* Khnz. sp. nov., рабнтыс; б—*T. ramicornis* Schilsky, голотип, ♂; г—в—усиковые членики 3—4 а—*T. araratlica*; в—*T. ramicornis*

Глаза волосистые (родовой признак), довольно крупно фасеточные, с вырезкой за местом прикрепления усиков. Лоб выпуклый, мелкоморщинистый и поверхностно точечный на нежно шагренированном фоне, покрыт длинными, отвесно торчащими волосками. Виски короткие, длинными торчащими щетниками, зубцеобразно обособлены от глаз. Верхняя губа почти голая, более чем вдвое шире длины, четырехугольная, с длинной основной перепонкой. Последний членник челюстных щупиков узкий, у вершины скошенный. Усики 4 члениками заходят за плечи, их членики 3—10 с густоволосистыми отростками, отростки 3-го и 4-го члеников отогнуты крючком (рис. 1, в), на члениках 5—7 они имеют вид изогнутой палочки, на члениках 8—10 они кончаются шишпообразно, длина отростков повышается до 6-го членика, затем убывает.

Переднеспинка поперечная, впереди сужена немного больше, чем сзади, с прямолинейным передним и задним краем, с широко закругленными углами, боковой край широко закруглен, мелко зазубрен по всей длине. Диск матовый, в такой же скульптуре и волосистости, как лоб, вдоль середины со следом гладкой полоски. Щиток желтый, поперечно овальный. Надкрылья в 1,6 раза длиннее общей ширины, покрыты густыми однородными вдавленными точками и косо торчащей, довольно длинной волосистостью на гладком фоне, точки отстоят в среднем на диаметр, местами сближены, с несколькими мелкими точками, разбросанными беспорядочно, контур переднеспинки и надкрылий с бахромой из длинных торчащих щетинок. Ноги, как обычно у этого рода, узкие и длинные, коготки с основным зубцом.

От всех прочих видов рода, кроме *T. gamicornis* Schilsky, 1900, легко отличается строением усиков. *T. gamicornis* описан с Александровского хребта, его оба типа, самец и самка, были нам любезно присланы из Берлина В. Улигом (рис. 1, б). Его тело одноцветно черное, переднеспинка сильно расширена за серединой, надкрылья в 1,7 раза длиннее общей ширины, все конечности черные, местами слегка осветлены, волосистость верха очень длинная. Длина 5—5,5 мм. У самца отростки усиков своеобразно расширены к вершине (рис. 1, г), у самок они узкие, длинные и относительно длиннее, чем у нашего нового вида, у которого вероятно также имеется сходный половой диморфизм.

Габитуально и по окраске новый вид также напоминает *T. fulvopilis* Rtt. из долины Аракса, у которого, однако, усики пальчатые у обоих полов, а надкрылья более удлинённые.

Институт зоологии
Академии наук Арийской ССР

Դադիաթիդ բզեզների նոր տեսակ Հայկական ՍՍՀ-ից

(Coleoptera, Dasytidae)

Նկարագրվում է բզեզի նոր տեսակ—Dasytidae ընտանիքից Եղեգնա-
ձորից՝ *Trichoceble araratlica* Khnz.։ Այս տեսակը մոտ է միջինասիական
T. ramicornis Schilsky տեսակին, տարբերվում են միմյանցից իրենց բեղիկների
լուրսհատկու թվամբով։